

 **PDF**
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

A V L I M A C I U D A D
o s p i t a l N a c i o n a l
D o c e n t e
M a d r e N i ñ o S a n



S A L A S I T U A C I O N A L

H O S P I T A L N A C I O N A L
D O C E N T E M A D R E N I Ñ O
S A N B A R T O L O M E

M a r z o 2 0 1 1



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



UBICACION

El Hospital óSan Bartoloméô se encuentra ubicado en la Av. Alfonso Ugarte 825 del Distrito de Lima Cercado, en la Provincia de Lima.

Sus límites son la Av. Alfonso Ugarte, el Jr. Peñaloza y el Jr. Chota. Contando también con una zona anexa denominada óLa Cocheraô ubicada entre la Av. Alfonso Ugarte y Jr. Chota donde están ubicados consultorios externos y oficinas administrativas.


M A P A



C A T E G O R I A H O S P I T A L A R I A Y N I V E L D E C O M P L E J I D A D

El Hospital Nacional Docente
Madre Niño ó San Bartolomé se
encuentra categorizado como
Hospital Categoría III-1, del
Tercer Nivel de Atención,
especializado en Gineco ñ
Obstetricia y Pediatría según
Resolución Directoral N°
615/2005-DG-DESP-DSS-DISA.
V.L.C

DIRECCION
GENERAL



C A M A S

Departamento	Camas Presupuestadas
Gineco-Obstetricia	108
Cirugía Pediátrica	35
Pediatría	40
Emergencia Y Cuidados Críticos	12
Neonatología	22
Total	217

Fuente: Unidad de Estadística y Banco de Datos
Elaborado: Oficina Planeamiento Estratégico

rsos Humanos

Areas	Cargos Ocupadas	Cargos Previstas	Total	% Previstos		Cargos de Confianza 4% del Total
Administrativa	167	14	181	20	181	13
Asistencial	682	53	735	80	735	14
Dirección	13	0	13		13	2
O C I	0	3	3		3	1
Total	862	70	932		8.12	30
			916	100	916	

Según CAP Reordenado a diciembre del 2010




PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*


[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

INFECCIONES INTRAHOSPITAL ARIAS

Endometritis Asociadas a Partos Vaginales , HOSPITAL SAN BARTOLOME 2007-2011




La Incidencia de Endometritis Puerperal asociada a parto vaginal para el primer trimestre del 2011, es 1,2/100 pv encontrándonos por arriba del Promedio Nacional (0,45), de la Categoría de Establecimiento III-1 (0,59) y también de la tasa presentada en el 2010 para el mismo periodo (0,83), debido probablemente al incumplimiento de las medidas de prevención del personal y al ingreso del personal rotante a la institución. Los factores de la atención hospitalaria relacionados a endometritis puerperal en parto vaginal son: tactos vaginales mayor a 4 durante el trabajo de parto, incumplimiento del lavado de manos según norma, quiebre de la técnica aséptica durante la atención del parto, los mismos que se pueden modificar mediante capacitación y supervisión permanente.



La incidencia de Endometritis Puerperal asociada a Cesárea para el primer trimestre del 2011 es 1,3/100 cesáreas, encontrándonos por arriba del Promedio Nacional (0,85) y de Categoría de Establecimiento III-1 (1,02), pero por debajo de la presentada en el primer trimestre del 2010(1,6) en nuestra institución.


La Endometritis asociada a cesárea tiene relación con factores vinculados a la Atención Hospitalaria como son: Inadecuado lavado de manos quirúrgico, incumplimiento de la norma de antibiopprofilaxis quirúrgica, ruptura de la técnica aséptica, excesivo número de tactos vaginales, modificables mediante capacitación y supervisión permanente.




La Densidad de Incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo (ITS) asociada a catéter Venoso Central (CVC) en la UCI de Neonatología, para el primer trimestre del 2011 es 13,4/1000 das catéter, encontrándonos por arriba del Promedio Nacional (10,89) y de la tasa presentada en el primer trimestre del 2010 (9,98), pero si comparamos con la tasa por categoría de establecimiento III-1 (17,58) ésta es menor.

Los factores de riesgo para ITS relacionados a la atención hospitalaria son: Quiebre de la técnica aséptica durante la instalación y manejo del catéter y sus conexiones, la interrupción del circuito cerrado estéril, así como el desplazamiento de los catéteres en el sitio de punción, todos modificables mediante capacitación y supervisión permanentes.

Incidencia de Neumonías Asociadas a Ventilación Mecánica UCI Neonatología , HOSPITAL SAN BARTOLOME 2007- 2011



El gráfico nos muestra los resultados de la vigilancia epidemiológica de Neumonía asociada a Ventilación Mecánica (VM) en la UCI de Neonatología, presentándose para el primer trimestre del 2011 una Densidad de Incidencia de 5,8/1000 días vm, encontrándonos por debajo del Promedio Nacional (7,63), de la Categoría de Establecimiento III-1 (9,79) y de la tasa presentada en el primer trimestre del 2010 (7,3) en nuestra institución..




La tasa de infección del Torrente Sanguíneo asociada a catéter venoso periférico en la UCI de Neonatología, para el primer trimestre del 2011 es cero, no habiéndose presentado ningún caso, al igual que en el primer trimestre del 2010.

ud Ambiental

Residuos Sólidos Peligrosos

Peso y Costo

HONADOMANI San Bartolome - Mayo 2010 a Marzo 2011.



Fuente: Notificación Diaria de Residuos Sólidos.

BRUNNER: 24 de Setiembre al 12 de Enero 2010 =100 S/.

PRISMA: 14 de Enero del 2010 al 14 Enero 2011 =100 S/

Kg. S/.



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Gracias